



# GROSSESSES A RISQUE



# Objectifs de la surveillance de la grossesse

- Diminuer la mortalité et morbidité maternelle.
- Diminuer la mortalité et morbidité périnatale.



# 1<sup>ère</sup> consultation

- La 1<sup>ère</sup> consultation à lieu avant la 14<sup>ème</sup> semaine de grossesse.
- Confirmer l'état de grossesse.
- Détecter une grossesse anormale.
- Déterminer le terme de la grossesse.
- Evaluer les facteurs de risques.



# Les facteurs de risques

- **Antécédents obstétricaux**
  - Grossesse antérieure (déroulement, terme, mode d'accouchement, poids, état de l'enfant).
  - Fausse couches (terme).
  - Grossesse extra-utérine.
- **Antécédents gynécologiques**
  - Infection pelvienne.
  - Stérilité traitée.
  - Malformation gynécologique.
- **Antécédents héréditaires**

# Antécédents médicaux



- Cardiopathie.
- Antécédent thrombo-embolique.
- Insuffisance respiratoire.
- Diabète.
- Pathologie rénale.
- Lupus.
- Epilepsie.
- Hépatite.
- Sida.
- Anémie.



# Facteurs Généraux et Sociaux

- Age inférieur à 16 ans ou supérieur à 38 ans.
- Obésité, maigreur.
- Taille inférieur à 1m50.
- Tabac, drogue, alcool.
- Conditions socio-économiques défavorables.





# Surveillances

- Examens cliniques
- Tension artérielle.
- Poids : peut prendre 1kg par mois jusqu'à 6 mois, puis 2kg par mois jusqu'à l'accouchement.
- Mouvement actif du fœtus vers 4 mois, et écoute des bruits du cœur.
- Toucher vaginal : apprécie la hauteur du bébé et la taille du bassin



# Examens biologiques

- Groupe sanguin + rhésus + RAI.
- Dépistage de la rubéole et de la toxoplasmose en l'absence d'immunité antérieure connue.
- Dépistage de maladie infectieuse : syphilis, hépatite B, HIV
- Recherche de trisomie 21
- Recherche d'un diabète gestationnel par test OMS
- ECBU pour dépister une infection urinaire.
- Prélèvement vaginal à la recherche du streptocoque B.
- Protéinurie (albumine).





# Echographies

## 1er trimestre :

- Vérifier que le terme est exact.
- Vérifier s'il y a un ou plusieurs foetus.
- Connaître le siège du bébé.
- Mesure de la clarté nucale qui augmente en cas d'anomalie chromosomique.
- Dépistage d'anomalies précoces.

## 2ème trimestre :

- Morphologie complète.

## 3ème trimestre :

- Insertion placentaire.
- Croissance du foetus.